

Tratamiento de una úlcera de etiología venosa con apósito de espuma de poliuretano con hidrogel

Objetivos

Los objetivos que se plantean en este caso son:

- Garantizar una óptima evolución de la cicatrización con un apósito de espuma de hidrogel
- Evitar el deterioro de la piel perilesional

Características

Se presenta un caso de una úlcera con las siguientes características:

- Paciente de 73 años de edad
- Varón
- Diabetes, insuficiencia venosa ambas piernas, HTA, vértigos Menier
- Linfodema en la pierna derecha
- Úlcera de 3 años de antigüedad
- La paciente refiere mucho dolor
- Depresión del paciente por inmovilidad que le produce la ulcera y dolor durante más de 3 años.

Metodología

Se comienza el tratamiento de la úlcera con el apósito **HydroTac®** y vendaje compresivo **Putterbinder**
Se realizan cambios de apósito cada 4-5 días aproximadamente.



Día 1



Día 1



2 SEMANAS



3 SEMANAS

Resultados

- A las 3 semanas de tratamiento, la herida ha cicatrizado. Se prescriben medias Saphenamed para evitar nueva aparición de úlceras y linfodema
- **HydroTac®** se trata de un apósito adecuado para heridas con un exudado de leve a moderado
- Se observa una evolución favorable, gracias a la cura en ambiente húmedo que se favorece gracias a la aportación de humedad de la capa de hidrogel.
- **HydroTac®** permite una correcta protección de los bordes epiteliales.